

Вакцины	Возраст	
	Вакцинация	Ревакцинация
*Оральная полиомиелитная (ОПВ)	0-при рождении в первые 24 часа, 2, 3 и 4 месяца	12 месяцев
**Гепатит В	При рождении в первые 24 часа	-
БЦЖ (вакцина против туберкулеза)	3-5 день после рождения	6,16 лет
Пентавалентная (АКДС, Hib, гепатит В)	2 -3 – 4 месяца	-
Коревая – краснушная	12 месяцев	6 лет
АКДС (адсорбированная вакцина против коклюша, дифтерии и столбняка)	-	16 – 23 месяцев
Адсорбированная дифтерийно - столбнячная (АДС)	-	6 лет

Адсорбированная дифтерийно - столбнячная с уменьшенным количеством антигенов (АДСм)	-	16-26-36-45-56 лет
Ротавирусная	2 – 3 месяца	-
***Инактивированная полиомиелитная (ИПВ)	4 месяца	-

* В случае, если ребенок не получил нулевую дозу полиовакцины при рождении, его следует привить в течении 14 дней со дня рождения.

** В случае, если ребенок не получил дозу гепатита В при рождении, его следует привить в течении 7 дней со дня рождения.

*** ИПВ вакцину планируется вводить с 2017 года.